

Física do século XX

[Método e recomendacións](#)

● Efecto fotoeléctrico

1. Unha radiación monocromática que ten unha lonxitude de onda de 600 nm penetra nunha célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuxo traballo de extracción é $3,2 \times 10^{-19}$ J. Calcula:
- A lonxitude de onda limiar para o cesio.
 - A enerxía cinética máxima dos electróns emitidos.
 - A velocidade máxima coa que son emitidos os electróns.
 - O potencial de freado.
 - Representa graficamente a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos en función da frecuencia da luz incidente.
 - A lonxitude de onda de De Broglie asociada aos electróns emitidos polo metal con velocidade máxima.

DATOS: $h = 6,62 \times 10^{-34}$ J·s; $c = 3 \times 10^8$ m·s⁻¹; $q_e = -1,6 \times 10^{-19}$ C; 1 nm = 10⁻⁹ m

Problema modelo baseado en A.B.A.U. ord. 18

Rta.: a) $\lambda_0 = 621$ nm; b) $E_c = 1,1 \cdot 10^{-20}$ J; c) $v = 1,6 \cdot 10^5$ m/s ; d) $V = 0,069$ V; f) $\lambda_d = 4,7$ nm

Datos

Lonxitude de onda da radiación
Traballo de extracción do metal
Constante de Planck
Velocidade da luz no baleiro
Carga do electrón

Cifras significativas: 3

$\lambda = 600$ nm = $6,00 \cdot 10^{-7}$ m
 $W_e = 3,20 \cdot 10^{-19}$ J
 $h = 6,62 \cdot 10^{-34}$ J·s
 $c = 3,00 \cdot 10^8$ m/s
 $q_e = -1,60 \times 10^{-19}$ C

Incógnitas

Lonxitude de onda limiar
Enerxía cinética máxima coa que son emitidos os electróns
Velocidade máxima dos electróns emitidos
Potencial de freado
Lonxitude de onda de De Broglie dos electróns

λ_0
 E_c
 v
 V
 λ_d

Ecuacións

Ecuación de Planck (enerxía do fotón)
Ecuación de Einstein do efecto fotoeléctrico
Relación entre a frecuencia dunha onda luminosa e a lonxitude de onda
Enerxía cinética
Relación entre a enerxía cinética dos electróns e o potencial de freado
Lonxitude de onda de De Broglie

$E_f = h \cdot f$
 $E_f = W_e + E_c$
 $f = c / \lambda$
 $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2$
 $E_c = |e| \cdot V$
 $\lambda_d = \frac{h}{m \cdot v}$

Solución:

Cando a luz interactúa co metal da célula fotoeléctrica faíno coma se fose un chorro de partículas chamadas fotóns (paquetes de enerxía).

Cada fotón choca cun electrón e transmíttelle toda a súa enerxía.

Para que se produza efecto fotoeléctrico, os electróns emitidos deben ter enerxía suficiente para chegar ao anticátodo, o que ocorre cando a enerxía do fotón é maior que o traballo de extracción, que é unha característica do metal.

A ecuación de Einstein do efecto fotoeléctrico pode escribirse:

$$E_f = W_e + E_c$$

Na ecuación, E_f representa a enerxía do fotón incidente, W_e o traballo de extracción do metal e E_c a enerxía cinética máxima dos electróns (fotoelectróns) emitidos.

A enerxía que leva un fotón de frecuencia f é:

$$E_f = h \cdot f$$

h é a constante de Planck e ten un valor moi pequeno: $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s.

a) A lonxitude de onda limiar corresponde a unha radiación coa enerxía mínima para provocar o efecto fotoeléctrico.

Na ecuación de Einstein do efecto fotoeléctrico substitúese a enerxía do fotón polo seu equivalente na ecuación de Planck:

$$\left. \begin{aligned} E_f &= W_e + E_c \\ E_f &= h \cdot f \end{aligned} \right\} h \cdot f = W_e + E_c$$

A radiación que teña a frecuencia limiar terá a enerxía estritamente necesaria para arrincar o electrón, pero non sobrá nada para comunicarlle enerxía cinética.

$$h \cdot f_0 = W_e + 0$$

A relación entre a frecuencia limiar e o traballo de extracción é:

$$W_e = h \cdot f_0$$

Calcúlase a frecuencia, despexándoa da relación anterior:

$$f_0 = \frac{W_e}{h} = \frac{3,20 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{6,62 \cdot 10^{-24} \text{ J}\cdot\text{s}} = 4,83 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}$$

Calcúlase a lonxitude de onda limiar, despexándoa na relación entre frecuencia e lonxitude de onda:

$$\lambda_0 = \frac{c}{f_0} = \frac{3,00 \cdot 10^8 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}}{4,83 \cdot 10^{14} \text{ s}^{-1}} = 6,21 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 621 \text{ nm}$$

b) Para calcular a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos emprégase ecuación de Einstein:

$$E_c = E_f - W_e$$

Calcúlase antes a enerxía dos fotóns, despois de substituír a frecuencia pola súa expresión en función da lonxitude de onda:

$$E_f = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda} = \frac{6,62 \cdot 10^{-34} \text{ [J}\cdot\text{s]} \cdot 3,00 \cdot 10^8 \text{ [m}\cdot\text{s}^{-1}]}{6,00 \cdot 10^{-7} \text{ [m]}} = 3,31 \cdot 10^{-19} \text{ J}$$

Calcúlase entón a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos:

$$E_c = 3,31 \cdot 10^{-19} \text{ [J]} - 3,20 \cdot 10^{-19} \text{ [J]} = 1,1 \cdot 10^{-20} \text{ J}$$

c) Calcúlase a velocidade a partir da expresión da enerxía cinética:

$$E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,1 \cdot 10^{-20} \text{ [J]}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ [kg]}}} = 1,6 \cdot 10^5 \text{ m/s}$$

d) Calcúlase o potencial de freado na ecuación que o relaciona coa enerxía cinética:

$$E_c = |e| \cdot V \Rightarrow V = \frac{E_c}{|e|} = \frac{1,1 \cdot 10^{-20} \text{ [J]}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ [C]}} = 0,069 \text{ V}$$


e) A representación gráfica é a seguinte:

A interpretación de Einstein do efecto fotoeléctrico demostrou que a luz se comporta como un chorro de partículas, chamadas fotóns, cuxa enerxía é proporcional á frecuencia:

$$E = h \cdot f$$

No efecto Compton, o fotón compórtase como unha partícula de momento lineal:

$$p = \frac{E}{c} = \frac{h \cdot f}{c} = \frac{h \cdot f}{\lambda \cdot f} = \frac{h}{\lambda}$$



Como xa estaba establecido que a luz se propaga como unha onda, propúxose que o comportamento era dual: nalgúns experimentos o comportamento da luz parece ser corpuscular e noutros, ondulatorio. De Broglie propuxo que este comportamento dual tamén afecto a calquera partícula. Nalgúns casos o comportamento de certas partículas podería interpretarse como o de ondas cuxa lonxitude de onda asociada λ vén dada pola expresión:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

h é a constante de Planck, m é a masa da partícula e v é a súa velocidade.

f) Calcúlase a lonxitude de onda asociada aos electróns usando a ecuación de De Broglie

$$\lambda_3 = \frac{h}{m \cdot v} = \frac{6,63 \cdot 10^{-34} \text{ [J}\cdot\text{s]}}{9,10 \cdot 10^{-31} \text{ [kg]} \cdot 1,6 \cdot 10^5 \text{ [m/s]}} = 4,7 \cdot 10^{-9} \text{ m} = 4,7 \text{ nm}$$

A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo [Física \(gal\)](#).

As instrucións para o manexo desta folla de cálculo poden verse na ligazón [instrucións](#).

Para ir á folla onde resolver un problema de Efecto fotoeléctrico, pode elixir unha destas opcións:

- Prema sobre a icona ►| do grupo ◀◀◀►►► situado na parte inferior esquerda da folla de cálculo e prema sobre a lapela: Foelectr.
- Ou, vaia ao índice, buscando a ligazón [Índice](#) na zona superior dereita e pulsando a tecla Ctrl mentres preme sobre [Índice](#). No índice, pulse a tecla Ctrl mentres preme sobre a cela [Efecto fotoeléctrico](#) do capítulo **Física moderna**.

Se ten borrado os datos, verá en DATOS:

Cátodo (Elixa unha unidade →)

Fotóns (Elixa unha unidade →)

Electróns (↑ Elixa a magnitude)

Escriba os datos nas celas de cor branca con bordo azul. Prema nas celas de cor salmón para elixir entre as opcións que se presentan. Para este problema debería ser:

Traballo de extracción $W_0 = 3,20 \cdot 10^{-19}$ J

Lonxitude de onda dos fotóns $\lambda = 600$ nm

Tamén pode escribir 3,2E-19 en vez de $3,20 \cdot 10^{-19}$. Os resultados son:

a) Lonxitude de onda limiar $\lambda_0 = 6,21 \cdot 10^{-7}$ m

Energía dos fotóns $E = 3,31 \cdot 10^{-19}$ J

b) **Energía cinética** $E = 1,11 \cdot 10^{-20}$ J

Facendo clic na cela de cor salmón pódense elixir os valores pedidos nos outros apartados.

c) **Velocidade máxima** $v = 1,56 \cdot 10^5$ m/s

d) **Potencial de freado** $V = 0,0691$ V

f) **Lonxitude de onda de De Broglie** $\lambda_d = 4,66 \cdot 10^{-9}$ m


Se escribe «2» á dereita de «f=», o aspecto da gráfica será:

GRÁFICAS

Energía cinética fronte a **Frecuencia**

dos **electróns** dos **fotóns**

Frecuencia máx. $f = 2 \cdot 10^{15}$ Hz



● Desintegración radioactiva

- O período de semidesintegración do ${}^{90}_{38}\text{Sr}$ é 28 anos. Calcula:
 - A constante de desintegración radioactiva expresada en s^{-1} .
 - A vida media do ${}^{90}\text{Sr}$.
 - A actividade inicial dunha mostra de 6,25 mg.
 - A masa que queda desa mostra 100 anos máis tarde.
 - O tempo necesario para que se desintegre o 70 % dos átomos iniciais.
 - Representa nunha gráfica, de forma cualitativa, a variación da masa en función do tempo.

Datos: $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; masa atómica do ${}^{90}_{38}\text{Sr} = 90 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

Problema modelo baseado no A.B.A.U. ord. 17

Rta.: a) $\lambda = 7,8 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$; b) $\tau = 40$ anos; c) $A_0 = 3,28 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$; d) $m = 0,53 \text{ mg}$; e) $t = 49$ anos

Datos

Período de semidesintegración

Masa da mostra

Tempo para calcular a masa restante

Fracción de mostra desintegrada

Masa atómica do ${}^{90}_{38}\text{Sr}$

Número de Avogadro

Incógnitas

Vida media

Constante de desintegración radioactiva

Actividade inicial dunha mostra de 6,25 mg.

Masa que queda desa mostra 100 anos máis tarde.

Tempo necesario para que a masa redúzase de 1 mg a 0,25 mg

Ecuacións

Lei da desintegración radioactiva

Cando $t = T$, $N = N_0 / 2$

Vida media

Actividade radioactiva

Cifras significativas: 3

$T_{1/2} = 28,0 \text{ anos} = 8,84 \cdot 10^8 \text{ s}$

$m_0 = 6,25 \text{ mg} = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ g}$

$t = 100 \text{ anos} = 3,16 \cdot 10^9 \text{ s}$

$f = 70,0 \% = 0,700$

$M = 90,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

τ

λ

A_0

m

t

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

$$\lambda = \ln(N_0 / N) / t$$

$$T_{1/2} = \ln 2 / \lambda$$

$$\tau = 1 / \lambda$$

$$A = -dN / dt = \lambda \cdot N$$

Solución:

- a) Calcúlase a constante radioactiva a partir do período de semidesintegración:

$$\lambda = \frac{\ln 2}{T_{1/2}} = \frac{0,693}{8,84 \cdot 10^8 [\text{s}]} = 7,84 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$$

- b) Calcúlase a vida media a partir da constante radioactiva:

$$\tau = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{7,84 \cdot 10^{-10} [\text{s}^{-1}]} = 1,27 \cdot 10^9 \text{ s} = 40,4 \text{ anos}$$

- c) Calcúlanse cantos átomos hai en 6,25 mg de Sr:

$$N = 6,25 \cdot 10^{-3} \text{ g } {}^{90}_{38}\text{Sr} \cdot \frac{1 \text{ mol } {}^{90}_{38}\text{Sr}}{90,0 \text{ g } {}^{90}_{38}\text{Sr}} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ átomos } {}^{90}_{38}\text{Sr}}{1 \text{ mol } {}^{90}_{38}\text{Sr}} \cdot \frac{1 \text{ núcleo } {}^{90}_{38}\text{Sr}}{1 \text{ átomo } {}^{90}_{38}\text{Sr}} = 4,18 \cdot 10^{19} \text{ núcleos } {}^{90}_{38}\text{Sr}$$

Calcúlase a actividade radioactiva:

$$A = \lambda \cdot N = 7,84 \cdot 10^{-10} [\text{s}^{-1}] \cdot 4,18 \cdot 10^{19} [\text{núcleos}] = 3,28 \cdot 10^{10} \text{ Bq}$$

- d) Emprégase a lei de desintegración radioactiva para calcular a masa:

$$N = N_0 \cdot e^{-\lambda \cdot t}$$

Como a masa é proporcional á cantidade de núcleos, $m = M \cdot N / N_A$, pódese obter unha expresión similar á lei da desintegración radioactiva, na que aparece a masa en lugar da cantidade de átomos:

$$m \frac{N_A}{M} = m_0 \frac{N_A}{M} e^{-\lambda t}$$

Calcúlase a masa:

$$m = 6,25 \text{ [mg]} \cdot e^{-7,84 \cdot 10^{-10} \text{ [s}^{-1}] \cdot 3,16 \cdot 10^9 \text{ [s]}} = 0,526 \text{ mg}$$

e) Emprégase a ecuación da lei de desintegración radioactiva expresada en forma logarítmica, para calcular o tempo:

$$-\ln(N / N_0) = \ln(N_0 / N) = \lambda \cdot t$$


Calcúlase o tempo, tendo en conta que queda o 30 %, ao desintegrarse o 70 %.

$$t = \frac{\ln(N_0/N)}{\lambda} = \frac{\ln(100 \text{ átomos}_{38}^{90}\text{Sr}/30 \text{ átomos}_{38}^{90}\text{Sr})}{7,84 \cdot 10^{-10} \text{ [s}^{-1}]} = 1,8 \cdot 10^9 \text{ s} = 49 \text{ anos}$$

Análise: Posto que nese tempo a mostra reduciuse a un 30 %, pouco máis da cuarta parte = $\left(\frac{1}{2}\right)^2$,

transcorreron algo menos de 2 períodos de semidesintegración (56 anos), polo que 49 anos parece un resultado razoable.

f) A gráfica é unha función exponencial decrecente.



A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo [Física \(gal\)](#).

As instrucións para o manexo desta folla de cálculo poden verse na ligazón [instrucións](#).

Para ir á folla onde resolver un problema de Efecto fotoeléctrico, pode elixir unha destas opcións:

- Prema sobre a icona ▶| do grupo |◀◀▶▶| situado na parte inferior esquerda da folla de cálculo e prema sobre a lapela: Desintegr.
- Ou, vaia ao índice, buscando a ligazón [Índice](#) na zona superior dereita e pulsando a tecla Ctrl mentres preme sobre [Índice](#). No índice, pulse a tecla Ctrl mentres preme sobre a cela [Desintegración radioactiva](#) do capítulo **Física moderna**.

Se ten borrado os datos, verá en DATOS:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cantidade inicial	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Despois de... $\Delta t =$	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Masa atómica $M =$	<input type="text"/>	g/mol
Tempo $t =$	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Faga clic nas celas de cor salmón e elixa as opcións como se mostra. Escriba os datos nas celas de cor branca e bordo azul. Para este problema debería ser:

Período de semidesintegración	$T =$	<input type="text" value="28"/> anos
-------------------------------	-------	--------------------------------------

Masa inicial	$m_0 =$	6,25 mg
Desintégranse		70 %
Despois de...	$\Delta t =$	
Masa atómica	$M =$	90 g/mol
Tempo	$t =$	100 anos

Para obter os primeiros resultados faga clic na cela cor salmón debaixo de «Constante» e elixa «Vida media». Faga clic na cela cor salmón debaixo de « τ » e elixa «Bq»

a)	Constante	$\lambda =$	$7,84 \cdot 10^{-10} \text{ s}^{-1}$
b)	Vida media	$\tau =$	$1,27 \cdot 10^9 \text{ s}$
Actividade Bq			
c)	Inicial	$3,28 \cdot 10^{10}$	
	Queda un 30%	$9,84 \cdot 10^9$	en 48,6 anos
	En 100 anos	$2,76 \cdot 10^9$	

Para os seguintes resultados, cambie «Bq» por «mg», e elixa «anos» na cela salmón da dereita:

Masa mg			
	Inicial	6,25	
e)	Queda un 30%	1,88	en 48,6 anos
d)	En 100 anos	0,526	

● Enerxía nuclear

1. O isótopo do boro ${}^{10}_5\text{B}$ é bombardeado por unha partícula α e prodúcese ${}^{13}_6\text{C}$ e outra partícula.

- Escribe a reacción nuclear.
- Calcula a enerxía liberada por núcleo de boro bombardeado.
- Calcula a enerxía liberada si considérase 1 g de boro.
- Calcula a enerxía de enlace nuclear do ${}^{13}_6\text{C}$.
- Calcula a súa enerxía de enlace por nucleón.

Datos: masa atómica(${}^{10}_5\text{B}$) = 10,0129 u; masa atómica(${}^{13}_6\text{C}$) = 13,0034 u; masa(α) = 4,0026 u; masa(protón) = 1,0073 u; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$; $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$. (P.A.U. sep. 16)

Rta.: a) ${}^{10}_5\text{B} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{13}_6\text{C} + {}^1_1\text{H}$; b) $E = 7,17 \cdot 10^{-13} \text{ J/átomo}$; c) $E_2 = 43,1 \text{ GJ/g}$

Datos

Masa: boro-10
carbono-13
partícula α
protón
Número de Avogadro
Unidade de masa atómica
Velocidade da luz no baleiro

Incógnitas

Enerxía liberada por núcleo de boro bombardeado
Enerxía liberada / g de boro

Outros símbolos

Constante de desintegración radioactiva

Ecuacións

Equivalencia masa enerxía de Einstein

Cifras significativas: 3

$m({}^{10}_5\text{B}) = 10,0129 \text{ u}$
 $m({}^{13}_6\text{C}) = 13,0034 \text{ u}$
 $m({}^4_2\text{He}) = 4,0026 \text{ u}$
 $m({}^1_1\text{H}) = 1,0073 \text{ u}$
 $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $1 \text{ u} = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$
 $c = 3,00 \cdot 10^8 \text{ m/s}$


E
 E_2

λ

$E = m \cdot c^2$

Solución:

a) Escríbese a reacción nuclear aplicando os principios de conservación do número másico e da carga eléctrica nos procesos nucleares.



b) Calcúlase o defecto de masa:

$$\Delta m = m({}^{13}\text{C}) + m({}^1\text{H}) - (m({}^{10}\text{B}) + m({}^4\text{He})) = 13,0034 \text{ [u]} + 1,0073 \text{ [u]} - (10,0129 \text{ [u]} + 4,0026 \text{ [u]}) = -0,00480 \text{ u}$$

$$\Delta m = -0,00480 \text{ u} \cdot 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg/u} = -7,97 \cdot 10^{-30} \text{ kg}$$

Calcúlase a enerxía equivalente segundo a ecuación de Einstein:

$$E = m \cdot c^2 = 7,97 \cdot 10^{-30} \text{ [kg]} \cdot (3,00 \cdot 10^8 \text{ [m/s]})^2 = 7,17 \cdot 10^{-13} \text{ J/átomo B}$$

c) Calcúlase a cantidade de átomos de boro que hai en 1 g de boro.

$$N = 1,00 \text{ g B} \cdot \frac{1 \text{ mol B}}{10,0129 \text{ g B}} \cdot \frac{6,022 \cdot 10^{23} \text{ átomos}}{1 \text{ mol}} = 6,01 \cdot 10^{22} \text{ átomos B}$$

Calcúlase a enerxía para 1 g de boro:

$$E_2 = 7,15 \cdot 10^{-13} \text{ [J/átomo B]} \cdot 6,01 \cdot 10^{22} \text{ [átomos B/g B]} = 4,31 \cdot 10^{10} \text{ J} = 43,1 \text{ GJ/g B}$$

d) O defecto de masa é a diferenza entre a masa do núcleo de ${}^{13}\text{C}$ e a suma das masas dos protóns e neutróns que o forman. O número de protóns é o número atómico, 6, e o de neutróns é 7, a diferenza entre o número másico 13 e o número de protóns 6.

$$\Delta m = m({}^{13}\text{C}) - 6 \cdot m({}^1\text{H}) - 7 \cdot m({}^1\text{n}) = 13,0034 \text{ [u]} - 6 \cdot 1,0073 \text{ [u]} - 7 \cdot 1,008665 \text{ [u]} = -0,101 \text{ u}$$

$$\Delta m = -0,101 \text{ [u]} \cdot \frac{1 \text{ [g]}}{6,02 \times 10^{23} \text{ [u]}} \cdot \frac{1 \text{ [kg]}}{10^3 \text{ [g]}} = -1,68 \cdot 10^{-28} \text{ kg}$$

A enerxía equivalente calcúlase coa ecuación de Einstein

$$E_e = m \cdot c^2 = 1,68 \cdot 10^{-28} \text{ [kg]} \cdot (3,00 \cdot 10^8 \text{ [m/s]})^2 = 1,51 \cdot 10^{-11} \text{ J/átomo } {}^{13}\text{C}$$


e) A enerxía de enlace por nucleón calcúlase dividindo entre o número de nucleóns:

$$E_{\text{en}} = \frac{1,51 \cdot 10^{-11} \text{ [J/átomo C]}}{13 \text{ [nucleóns/átomo C]}} = 1,16 \cdot 10^{-12} \text{ J/nucleón}$$

A maior parte das respostas pode calcularse coa folla de cálculo [Física \(gal\)](#).

As instrucións para o manexo desta folla de cálculo poden verse na ligazón [instrucións](#).

Para ir á folla onde resolver un problema de Efecto fotoeléctrico, pode elixir unha destas opcións:

- Prema sobre a icona ▶ do grupo ◀ ◀ ▶ ▶ situado na parte inferior esquerda da folla de cálculo e prema sobre a lapela: .
- Ou, vaia ao índice, buscando a ligazón [Índice](#) na zona superior dereita e pulsando a tecla Ctrl mentres preme sobre [Índice](#). No índice, pulse a tecla Ctrl mentres preme sobre a cela [Enerxía nuclear](#) do capítulo **Física moderna**.

Se ten borrado os datos, verá en DATOS:

	N.º atómico	Z	N.º másico A
Partícula proxectil			
Núclido diana			
Núclido formado			
2º núclido/partícula			
Masa da mostra			

Faga clic nas celas de cor salmón e elixa as opcións como se mostra. Escriba os datos nas celas de cor branca e bordo azul. Para este problema debería ser:

	Carga	(e ⁺)	Masa
Partícula proxectil		2	4,0026 u
Núclido diana		5	10,0129 u
Núclido formado		6	13,0034 u
Partícula emitida		1	1,0073 u

2ª partícula emitida			
Masa da mostra		1 g	N. diana

Os resultados son:

${}^4_2\text{He} + {}^{10}_5\text{B} \rightarrow {}^{13}_6\text{C} + {}^1_1\text{H}$			
Defecto de masa $\Delta m =$	$-7,17 \cdot 10^{-13}$	J /átomo	
Energía da mostra $E =$	43,1	GJ /g ${}^{10}_5\text{B}$	

Para calcular a enerxía de enlace do carbono-13, hai que borrar todos os datos excepto o do carbono.

	Carga (e^+)	Masa	
Partícula proxectil			
Núclido diana			
Núclido formado	6	13,0034 u	
Partícula emitida			
2ª partícula emitida			
Masa da mostra			

Los resultados son agora:

Energía de enlace $E_e =$	$-1,51 \cdot 10^{-11}$	J /átomo
---------------------------	------------------------	----------

Se cambiamos agora «/átomo» por «/nucleón» obtemos:

Energía de enlace $E_e =$	$-1,16 \cdot 10^{-12}$	J /nucleón
---------------------------	------------------------	------------

Cuestións e problemas das [Probas de avaliación de Bacharelato para o acceso á Universidade](#) (A.B.A.U. e P.A.U.) en Galiza.

[Respostas](#) e composición de [Alfonso J. Barbadillo Marán](#).

Alguns cálculos fixéronse cunha [folla de cálculo](#) de [LibreOffice](#) do mesmo autor.

Algunhas ecuacións e as fórmulas orgánicas construíronse coa extensión [CLC09](#) de Charles Lalanne-Cassou.

A tradución ao/desde o galego realizouse coa axuda de [traducindote](#), e de o [tradutor da CIXUG](#).

Procurouse seguir as [recomendacións](#) do Centro Español de Metrología (CEM).

Consultouse ao Copilot de Microsoft Edge e tivéronse en conta algunhas das súas respostas nas cuestións.

Actualizado: 16/07/24

Sumario

FÍSICA DO SÉCULO XX

<i>Efecto fotoeléctrico</i>	1
1. Unha radiación monocromática que ten unha lonxitude de onda de 600 nm penetra nunha célula fotoeléctrica de cátodo de cesio cuxo traballo de extracción é $3,2 \times 10^{-19}$ J. Calcula:.....	1
a) A lonxitude de onda limiar para o cesio.....	
b) A enerxía cinética máxima dos electróns emitidos.....	
c) A velocidade máxima coa que son emitidos os electróns.....	
d) O potencial de freado.....	
e) Representa graficamente a enerxía cinética máxima dos electróns emitidos en función da frecuencia da luz incidente.....	
f) A lonxitude de onda de De Broglie asociada aos electróns emitidos polo metal con velocidade máxima.....	
<i>Desintegración radioactiva</i>	4
1. O período de semidesintegración do $^{90}_{38}\text{Sr}$ é 28 anos. Calcula:.....	4
a) A constante de desintegración radioactiva expresada en s^{-1}	
b) A vida media do ^{90}Sr	
c) A actividade inicial dunha mostra de 6,25 mg.....	
d) A masa que queda desa mostra 100 anos máis tarde.....	
e) O tempo necesario para que se desintegre o 70 % dos átomos iniciais.....	
f) Representa nunha gráfica, de forma cualitativa, a variación da masa en función do tempo.....	
<i>Energía nuclear</i>	6
1. O isótopo do boro $^{10}_5\text{B}$ é bombardeado por unha partícula α e prodúcese $^{13}_6\text{C}$ e outra partícula.....	6
a) Escribe a reacción nuclear.....	
b) Calcula a enerxía liberada por núcleo de boro bombardeado.....	
c) Calcula a enerxía liberada si considérase 1 g de boro.....	
d) Calcula a enerxía de enlace nuclear do $^{13}_6\text{C}$	
e) Calcula a súa enerxía de enlace por nucleón.....	